

## GASTROENTEROLOGÍA MÁS QUE SIGMOIDOSCOPIA

Nuestros gastroenterólogos tratan muchos tipos de condiciones digestivas. ¡Llámenos para hacer una cita!

**Estas son solo algunas de las condiciones digestivas que tratan nuestros gastroenterólogos:**

- Diarrea o estreñimiento
- Acidez estomacal o reflujo
- Sangrado rectal o heces negras
- Dificultad para tragar o disfagia
- Pérdida de peso involuntaria o pérdida de apetito
- Dolor abdominal o distensión abdominal
- Dificultades para comer

**Algunas enfermedades que podemos ayudarle a controlar:**

- Reflujo y esófago de Barrett
- Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y otras enfermedades inflamatorias intestinales
- Diverticulosis y diverticulitis
- Síndrome del intestino irritable (SII)
- Enfermedades del hígado, como la hepatitis y la cirrosis
- Enfermedades pancreáticas
- Esprúe celíaco (enfermedad autoinmune del pan/trigo/pasta)

**También realizamos otros procedimientos:**

- Endoscopia superior del esófago, estómago y duodeno
- Colonoscopia para la detección del cáncer y el diagnóstico de anomalías del colon
- CPRE para acceder al sistema de drenaje del hígado y la vesícula biliar
- Endoscopia con cápsula de vídeo (cámara de pastillas) para obtener imágenes del intestino delgado
- Sonda "Bravo" de medición de ácidos mediante endoscopia superior

## SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO PARA:

Fecha	Hora
<input type="checkbox"/>	Bret Ancowitz, MD
<input type="checkbox"/>	Thomas Dunzendorfer, MD
<input type="checkbox"/>	Phani Molakatalla, MD

**Por favor, llegue a \_\_\_\_\_ A.M./P.M.**

**Por favor, regístrese el día del procedimiento en:**

Heywood Hospital  
242 Green Street  
Gardner, MA 01440

Entre por la entrada principal y diríjase al Departamento de Cirugía.



### Heywood Gastroenterología

Bret Ancowitz, MD  
Thomas Dunzendorfer, MD  
Phani Molakatalla, MD

250 Green Street  
Suite 104, Medical Arts Building  
Gardner, MA 01440  
978-669-5522

[www.Heywood.org/Services/Gastroenterology](http://www.Heywood.org/Services/Gastroenterology)

## Instrucciones para la sigmoidoscopia con 2 enemas FLEET

## 14 DÍAS ANTES

- Revise las instrucciones.

## 7 DÍAS ANTES

- Deje de tomar hierro (sulfato ferroso) 7 días antes de la sigmoidoscopia.

**Por favor, llame al profesional que le prescribe sus recetas médicas si usted toma uno de los siguientes anticoagulantes, ya que puede que haga cambios antes de su sigmoidoscopia:**

- Coumadin (Warfarina)
- Plavix (Clopidogrel)
- Aggrenox Ticlid (Ticlopidina)
- Pradaxa (Dabigatrán)
- Effient (Prasugrel)
- Brilinta (Ticagrelor)
- Eliquis (Apixaban)
- Xarelto
- Las inyecciones de Lovenox deben suspenderse 24 horas antes de su procedimiento.

**No suspenda ningún medicamento recetado que no sea de los mencionados anteriormente.**

**Compre lo siguiente:**

- Compre dos (2) botellas de enemas FLEET (caja verde y blanca).
- FLEET enema es una marca registrada, que está disponible en la mayoría de las farmacias sin receta médica.



## DÍA DEL PROCEDIMIENTO

**2 horas antes de salir de su casa para el procedimiento:**

- **Por favor, utilice dos enemas FLEET siguiendo cuidadosamente las instrucciones del paquete para garantizar el éxito de la prueba**
- **Una vez administrados los enemas FLEET, NO COMA NI BEBA NADA HASTA DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO.**

Tome su medicación habitual con un sorbo de agua. Por favor, traiga una lista de los medicamentos actuales.

**Si tiene diabetes:**

Si toma insulina por la mañana, tome media dosis de insulina la mañana del procedimiento.

Si toma una pastilla para la diabetes, no tiene que tomársela la mañana del procedimiento a menos que se le indique lo contrario.

**Por favor, chequee el nivel de azúcar en sangre por la mañana y si es bajo o si se siente tembloroso, beba jugo de manzana, bebida deportiva o refresco.**

**LLEGUE 1 HORA ANTES de la hora del procedimiento:**

Tenga en cuenta que puede que esté en el hospital de 2 a 4 horas. Su transporte debe estar disponible para recogerlo cuando lo llamemos del Departamento de cirugía en cualquier momento dentro de ese rango.

**Llame a nuestra oficina al 978-669-5522 con cualquier pregunta, para cancelar o reprogramar su procedimiento.**

## SEDACIÓN

La mayoría de las personas se someten a este procedimiento sin sedante. Si cree que va a necesitar sedante, tenga en cuenta los siguientes requisitos:

- Los Hospitales Heywood & Athol REQUIEREN que alguien lo lleve a casa después de la sedación, no puede tomar un taxi a casa sin un adulto acompañante. NO puede volver a casa caminando o conduciendo usted mismo.
- Debe tener el estómago vacío para el procedimiento si es que va a recibir sedante. No puede consumir alimentos sólidos dentro de las ocho (8) horas de su procedimiento.
- Sólo puede tomar líquidos claros hasta dos horas antes del procedimiento.

**Dieta de líquidos claros:**

- Gelatina
- Caldo o consomé claro
- Café o té con azúcar y miel (sin leche ni crema)
- Jugos de fruta claros y sin pulpa (por ejemplo, manzana, arándanos, uva)
- Bebidas carbonatadas (Sprite, ginger ale, 7UP, Pepsi)
- Agua

No consuma líquidos de color rojo, alcohol, productos lácteos, jugo de naranja ni antiácidos calcáreos.

**Si usted siente que puede necesitar sedación, por favor notifíquenos inmediatamente al 978-669-5522.**