

Durante una endoscopia digestiva superior, se pueden obtener muestras de tejido (biopsias) para detectar enfermedades y condiciones que puedan estar causando anemia, hemorragia, inflamación o diarrea. También puede detectar algunos cánceres del aparato digestivo superior.

#### Se puede dar tratamiento:

Se pueden pasar instrumentos especiales a través del endoscopio para dar tratamiento a problemas con el sistema digestivos superior. Por ejemplo, se puede utilizar el cauterio para detener la hemorragia de los vasos sanguíneos y globos para ensanchar un esófago estrecho.

#### Gastroenterología - Más que una endoscopia digestiva superior

Nuestros gastroenterólogos tratan muchos tipos de condiciones digestivas. ¡Llámenos para hacer una cita!

#### Éstas son sólo algunas de las condiciones digestivas que tratan nuestros gastroenterólogos:

- Diarrea o estreñimiento
- Acidez o reflujo
- Sangrado rectal o heces negras
- Dificultad para tragar o disfagia
- Pérdida de peso involuntaria o pérdida de apetito
- Dolor o hinchazón abdominal
- Dificultades para comer

#### Algunas enfermedades que podemos ayudarle a controlar:

- Reflujo y esófago de Barrett
- Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, otras enfermedades inflamatorias intestinales
- Diverticulosis y diverticulitis
- Síndrome del intestino irritable (SII)
- Enfermedades del hígado, como hepatitis y cirrosis
- Enfermedades pancreáticas
- Esprúe celíaco (enfermedad autoinmune del pan, el trigo y la pasta)

#### También realizamos otros procedimientos:

- Endoscopia superior del esófago, estómago y duodeno
- Colonoscopia para la detección del cáncer y el diagnóstico de anomalías del colon
- CPRE para acceder al sistema de drenaje del hígado y la vesícula biliar
- Endoscopia con cápsula de vídeo (cámara de pastillas) para obtener imágenes del intestino delgado
- Sonda "Bravo" para medir la acidez mediante endoscopia digestiva superior

## SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO PARA:

Fecha	Hora
-------	------

- Bret Ancowitz, MD
- Thomas Dunzendorfer, MD
- Phani Molakatalla, MD

Por favor, llegue a \_\_\_\_\_ A.M./P.M.

Por favor, regístrese el día de su procedimiento en:

Heywood Hospital  
242 Green Street  
Gardner, MA 01440

Entre por la entrada principal y diríjase al Departamento de cirugía.



## Instrucciones para la endoscopia digestiva superior (EGD)

**Heywood Gastroenterology**  
Bret Ancowitz, MD  
Thomas Dunzendorfer, MD  
Phani Molakatalla, MD

250 Green Street  
Suite 104, Medical Arts Building  
Gardner, MA 01440  
978-669-5522

[www.Heywood.org/Services/Gastroenterology](http://www.Heywood.org/Services/Gastroenterology)



**Heywood Healthcare**

Athol Hospital | Heywood Hospital | Heywood Medical Group

## 14 DÍAS ANTES

- Organice el transporte.
- Revise las instrucciones.

## 7 DÍAS ANTES

- Deje de tomar hierro (sulfato ferroso) 7 días antes de la endoscopia.

**Llame al profesional que le prescribe sus medicamentos si toma alguno de los siguientes anticoagulantes, ya que puede que haga cambios antes de su endoscopia:**

- Coumadin (Warfarina)
- Plavix (Clopidogrel),
- Aggrenox Ticlid (Ticlopidina)
- Pradaxa (Dabigatrán)
- Effient (Prasugrel)
- Brilinta (Ticagrelor)
- Eliquis (Apixaban),
- Xarelto
- Las inyecciones de Lovenox deben suspenderse 24 horas antes de su procedimiento.

Si tiene diabetes, póngase en contacto con el medico que se la controla para revisar las modificaciones de la dieta y la medicación antes de la endoscopia.

No suspenda ningún medicamento recetado que no sea de los mencionados anteriormente.

## DÍA DEL PROCEDIMIENTO

**NO COMA NI BEBA NADA** después de la medianoche antes del procedimiento.

- NO chicle
- NO fumar
- NO líquidos

Tome sus medicamentos habituales de la mañana con un pequeño sorbo de líquido (excepto el hierro y cualquier cosa que le hayan pedido que deje de tomar). Si necesita alguno de los siguientes medicamentos, asegúrese de tomarlos:

- Cardíacos (corazón)
- Convulsiones
- Presión arterial
- Medicamentos para el asma e inhaladores

### **LLEGUE 1 HORA ANTES de la hora del procedimiento:**

Tenga en cuenta que puede que esté en el hospital de 2 a 4 horas. Su transporte debe estar disponible para recogerlo cuando lo llamemos del Departamento de cirugía en cualquier momento dentro de ese rango.

Los Hospitales Heywood & Athol **REQUIEREN** que alguien lo lleve a casa. No puede tomar un taxi a casa sin un adulto acompañante. **NO** puede volver a casa caminando o conduciendo usted mismo.

Llame a nuestra oficina al 978-669-5522 con cualquier pregunta, para cancelar o reprogramar su procedimiento.

